

Guía de Preparación de Diagnóstico

Usted está programado para los siguientes estudios: Location:  Alabaster  Clanton

Ecocardiograma

Fecha y Hora:

Prueba de Resistencia Nuclear/ Tomografía Pet

Fecha y Hora:

Puntuación de calcio

Fecha y Hora:

Doppler arterial, venoso, carotideo, ITB

Fecha y Hora:

Renal/ AAA

Fecha y Hora:

Si cancela su(s) examen(es), asegúrese de reprogramarlo(s) y completarlo(s) dentro de los 60 días. Es posible que el seguro no lo cubra después de ese tiempo.

**Ecocardiograma:** *No preparación requerida para el ecocardiograma.*

**Prueba de Resistencia/ Tomografía PET:**

**Tiempo asignado para:** Nuclear- al menos 3-4 horas. PET: Al menos 1-1.5 horas.

1. No consumir productos con cafeína, descafeinados, o con chocolate 24 horas antes de su prueba. (Eso incluye café, té, y refrescos).
2. No comer ni beber (con la excepción de agua), durante 4 horas antes de su prueba
3. No fumar ni productos de tabaco, incluido el parche de nicotina, durante 4 horas antes de la hora programada para su prueba.
4. No use Viagra, Cialis, o Levitra durante las 36 horas anteriores de su prueba.
5. Si usa un inhalador, traigalo con usted el día de su prueba.
6. Las mujeres deben usar un traje de dos piezas y evitar usar un vestido. Los hombres deben usar un traje de dos piezas y evitar usar overoles. Eviten los botones de metal o broches. Traiga un par de zapatos cómodos para caminar en caso de que los necesite.
7. SÓLO para una prueba de esfuerzo nuclear: no deberá tomar ningún medicamento betabloqueante durante 24 horas

**Puntuación de Calcio:** *No hay requisitos de preparación para Calcium Score*

**Doppler arterial, venoso, carotideo, ITB:** *Sin requisitos de preparación*

**Para Todas las Pruebas:**

Por favor de retener solamente los medicamentos que le indiquen por la mañana el día de su(s) estudio(s). Todos los demás medicamentos deben tomarse normalmente con un sorbo de agua.

**Renal/ AAA:**

1. No comer o beber por la boca a partir de la medianoche de la noche anterior de su prueba.
2. Tomar medicamento comprado de la tienda, como Gas-X, la noche anterior y la mañana de su prueba.
3. No mascar chicle 4 horas antes de la prueba.